



PIQRAY®

(alpelisib) comprimidos recubiertos

Guía de dosificación y administración¹

La primera y única terapia específica para pacientes con
cáncer de mama avanzado (CMA) con una mutación PIK3CA¹

Indicación¹

Piqray® está indicado en combinación con fulvestrant, para el tratamiento de mujeres postmenopáusicas y de varones, con cáncer de mama avanzado o metastásico, Receptor Hormonal positivo (RH+), Receptor tipo 2 del Factor de Crecimiento Epidérmico Humano negativo (HER2-) y presencia de mutación en el gen PIK3CA, después de la progresión con o luego de un régimen de tratamiento que incluyó terapia endocrina.

Información adicional¹

◆ Disfunción renal



No se recomienda ajustar la dosis para pacientes con insuficiencia renal leve a moderada (Clcr de 30 a <90 ml/min)

Se desconoce el efecto de la insuficiencia renal grave (Clcr <30 ml/min) sobre la farmacocinética de alpelisib.

◆ Disfunción hepática



No se requieren ajustes de dosis en pacientes con disfunción hepática leve, moderada o severa (Clases de Child-Pugh A, B o C, respectivamente).

Ver la Información para Prescribir completa de fulvestrant para consultar modificaciones de las dosis relacionadas con la disfunción hepática.

◆ Efecto de otros fármacos sobre PIQRAY®

Sustratos de CYP3A4

Se recomienda precaución y estricto control cuando se utiliza PIQRAY® en combinación con sustratos de CYP3A4 que también poseen un potencial de inhibición dependiente del tiempo y de inducción adicional sobre CYP3A4 que afecta a su propio metabolismo y exposición sistémica (por ejemplo, rifampicina, ribociclib, encorafenib).

Sustratos de CYP2C9 con índice terapéutico estrecho

Se recomienda precaución y estricto control cuando PIQRAY se administra en forma concomitante con fármacos que son sustratos de CYP2C9 con un índice terapéutico estrecho (por ejemplo, warfarina) en los que las disminuciones de las concentraciones plasmáticas pueden disminuir la actividad de estos fármacos.

Sustratos sensibles de CYP2B6 con índice terapéutico estrecho

Los sustratos sensibles de CYP2B6 (por ejemplo, bupropión) o los sustratos de CYP2B6 con una ventana terapéutica estrecha deben utilizarse con precaución y controlarse atentamente en combinación con PIQRAY®, porque este último puede disminuir la actividad clínica de aquellos fármacos.

◆ Efecto de los alimentos

Los alimentos afectan la absorción de alpelisib. No se observaron diferencias significativas en el AUC de alpelisib entre comidas con bajo contenido de grasas, hipocalóricas, con alto contenido de grasas o hipercalóricas. Se considera que el aumento de la solubilidad gastrointestinal por la bilis, segregada en respuesta a los alimentos es el impulsor de los efectos de los alimentos.

Referencia: 1.

PIQRAY® (alpelisib). Último prospecto aprobado por ANMAT.

Material para uso exclusivo del profesional.
Prohibida su exhibición y/o entrega a pacientes,
consumidores y/o al público en general.

Para acceder a la información del producto
escanee el código QR o solicítelo al 0 800 777 1111.



AG2104295136 | Abril-2021



NOVARTIS

Novartis Argentina S.A.
Ramallo 1815 - C1429DUC Bs As Argentina
Tel. +54 (11) 4703-7000 / 0800-777-1111